CALENDÁRIO VACINAL SBIm 2025/2026

Do nascimento à terceira idade

SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES

VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																		ADOLESCENTE	ADULTO		IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS		
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 a 19 anos	20 a 49 anos	50 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS NA REDE PÚBLICA	SERVIÇOS PRIVADOS	NOS CRIE*
BCG ID	Uma dose	Vacinar os não vacinados anteriormente																	Vacinar pessoas contactantes de hanseníase				SIM	SIM	NÃO
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento												Vacinar os não vacinados anteriormente										SIM	SIM	SIM
Rotavírus			Vacina rotavírus monovalente: duas doses aos 2 e 4 meses de idade. Vacina rotavírus pentavalente: três doses aos 2, 4 e 6 meses de idade.						Vacinar os não vacinados anteriormente D1 até 11 meses e 29 dias e última dose até 23 meses e 29 dias					CONTRAINDICADA								SIM	SIM	NÃO
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)			Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade									REFORÇO			Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa			Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, usar dT)					SIM, DTPw e dT; dTpa para gestantes e profissionais da saúde	SIM, DTPa e dTpa	SIM, DTPa
Haemophilus influenzae b			Três doses iniciando aos 2 meses de idade									REFORÇO				Vacinar pessoas em situações especiais de risco							SIM, três primeiras doses	SIM	SIM
Poliomielite (vírus inativados)			Três doses iniciando aos 2 meses de idade									REFORÇO			REFORÇO			Vacinar pessoas em situações especiais de risco					SIM, três primeiras doses e reforço aos 15 meses	SIM	SIM
Pneumocócicas conjugadas			Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada VPC20, VPC15, VPC13 ou VPC10 (PNI), iniciando aos 2 meses de idade								REFORÇO		VPC20, VPC15, VPC13 ou VPC10 (PNI) – Vacinar os não vacinados anteriormente					VPC20, VPC15, VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco		VPC20, VPC15, VPC13: uma dose		SIM, VPC10, menores de 5 anos	SIM	SIM, VPC10 e VPC13
Pneumocócica 23 valente														Vacinar pessoas em situações especiais de risco						Uma dose	Duas doses com intervalo de cinco anos	NÃO	SIM	SIM
Meningocócica conjugada ACWY ou C				Duas doses iniciando aos 3 meses de idade							REFORÇO					REFORÇO			Para não vacinados até 15 anos, duas doses com intervalo de cinco anos. A partir de 16 anos, uma dose	Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM, menC aos 3 e 5 meses, menACWY no reforço aos 12 meses e para 11-14 anos	SIM	SIM, menC e menACWY
Meningocócica B				Duas doses iniciando aos 3 meses de idade							REFORÇO		Para os não vacinados anteriormente – Duas ou três doses de acordo com a faixa etária e a vacina utilizada							Vacinar pessoas em situações especiais de risco			NÃO	SIM	NÃO
Influenza (gripe)							VACINAÇÃO ANUAL																SIM, Trivalente menores de 5 anos e maiores de 60 anos	SIM, Tri ou Tetravalente e HD4V (60 anos ou +)	SIM, Trivalente
Febre amarela										Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. / **Recomendação do PNI**: se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos, indicada uma segunda dose, independentemente da idade atual. Se aplicada a partir dos 5 anos: dose única. / **Recomendação da SBIm**: Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal mesmo para quem receber a primeira dose a partir dos 5 anos, a SBIm recomenda uma segunda dose dez anos após. / Essa vacina pode ser exigida para emissão do CIVP, atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Neste caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.												SIM	SIM	NÃO
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)											Duas doses a partir dos 12 meses				Vacinar os não vacinados anteriormente						Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, até 59 anos	SIM	NÃO
Varicela (catapora)											Duas doses a partir dos 12 meses				Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente					Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM	SIM	SIM
Hepatite A											Duas doses a partir dos 12 meses				Vacinar os não vacinados anteriormente						Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, uma dose para menores de 5 anos	SIM	SIM
HPV**																		Duas doses com intervalo mínimo de seis meses entre elas.	Vacinar adultos com três doses (0-1 a 2-6 meses)	A critério médico, vacinar pessoas em situações especiais de risco, três doses (0-1 a 2-6 meses)			SIM, HPV4 uma dose para meninas e meninos de 9 a 14 anos.	SIM, HPV9	SIM, HPV4 três doses para homens e mulheres até 45 anos pertencentes a grupos especiais
Herpes zóster																		Duas doses, dois meses de intervalo. A partir dos 18 anos, vacinar pessoas em situações especiais de risco		Duas doses, dois meses de intervalo. Rotina a partir dos 50 anos			NÃO	SIM	NÃO
Dengue***															*Qdenga*® é a vacina preferencial, recomendada entre 4 e 60 anos, independente de contato prévio com o vírus da dengue – duas doses com intervalo de três meses entre elas. *Dengvaxia*® é recomendada entre 6 e 45 anos, somente para soropositivos para dengue – três doses com intervalo de seis meses entre elas.								SIM, Qdenga® para 10 a 14 anos	SIM	NÃO
Covid-19	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19																								
VSR	Nirsevimabe – Dose única para < 8 meses na primeira sazonalidade											Imunizar crianças em situações especiais de risco								Vacina VSR**** – Uma dose			NÃO	SIM	NÃO
VACINAS	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 a 19 anos	20 a 49 anos	50 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIEs*
	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																		ADOLESCENTE	ADULTO		IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS		

19/08/2025 – Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos *Calendários de vacinação SBIm 2025/2026* e nos *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais.*

* Consultar manual do CRIE em https://sbim.org.br/images/calendarios/manual-dos-centros-de-referencia-para-imunobiologicos-especiais-6a-edicao-2023.pdf (acesso em 23.05.2025). Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais.*

** Esquemas para menores de 20 anos. PNI: HPV4 uma dose dos 9-14 anos. SBIm: HPV9 duas doses dos 9-19 anos e três doses de 20 anos em diante.

*** Notas técnicas do MS: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue/notas-tecnicas

**** Arexvy® (GSK) e Abrysvo® (Pfizer) uma dose, aplicar a qualquer momento, independente da sazonalidade. Em idosos de 60-69 anos, em condições de risco e de rotina para ≥ 70 anos. / Arexvy® (GSK) e Abrysvo® (Pfizer) recomendadas dos 50-59 anos em condições de risco. / Abrysvo® (Pfizer) é licenciada pela ANVISA dos 18 anos em diante para pessoas em condições de risco. Dos 18 aos 49 anos, nessas situações, uso a critério médico.

Rotina · Vacinar não vacinados · Situações especiais · Contraindicada

Manual do CRIE

Calendários de vacinação SBIm

Magic RM 19.08.2025