

CALENDÁRIO VACINAL SBI_m 2026/2027

Do nascimento à terceira idade



VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																		ADOLESCENTE		ADULTO		IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS					
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 a 19 anos	20 a 49 anos	50 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS NAS UBS	SERVIÇOS PRIVADOS DE VACINAÇÃO	NA RIE*				
BCG ID	Uma dose	Vacinar os não vacinados anteriormente														Vacinar pessoas contactantes de hanseníase										SIM	SIM	NÃO	
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento							Vacinar os não vacinados anteriormente																SIM	SIM	SIM			
Rotavírus			Vacina rotavírus monovalente: duas doses aos 2 e 4 meses de idade. Vacina rotavírus pentavalente: três doses aos 2, 4 e 6 meses de idade.						Vacinar os não vacinados anteriormente D1 até 11 meses e 29 dias e última dose até 23 meses e 29 dias						CONTRAINDICADA										SIM	SIM	NÃO		
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)			Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade									REFORÇO			Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa		Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, usar dT)							SIM, DTPw e dT; dTpa para gestantes e profissionais da saúde	SIM, DTPa e dTpa	SIM, DTPa			
Haemophilus influenzae b			Três doses iniciando aos 2 meses de idade									REFORÇO				Vacinar pessoas em situações especiais de risco							SIM, três primeiras doses	SIM	SIM				
Poliomielite (vírus inativados)			Três doses iniciando aos 2 meses de idade									REFORÇO				REFORÇO		Vacinar pessoas em situações especiais de risco							SIM, três primeiras doses e reforço aos 15 meses	SIM	SIM		
Pneumocócicas conjugadas (VPC15, VPC20)			Esquema 3+1 (SBIm) ou 2+1 (PNI), iniciando aos 2 meses de idade									REFORÇO		VPC20 e VPC15: Vacinar os não vacinados anteriormente			VPC20: vacinar pessoas em situações especiais de risco					VPC20: uma dose		SIM, VPC20, menores de 5 anos	SIM, VPC20 e VPC15	SIM, VPC20			
Meningocócica conjugada ACWY ou C				Duas doses iniciando aos 3 meses de idade						REFORÇO					REFORÇO				Para não vacinados até 15 anos, duas doses com intervalo de cinco anos. A partir de 16 anos, uma dose		Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, menC aos 3 e 5 meses, menACWY no reforço aos 12 meses e para 11-14 anos	SIM	SIM, menC e menACWY				
Meningocócica B				Duas doses iniciando aos 3 meses de idade						REFORÇO		Para os não vacinados anteriormente – Duas doses de acordo com a faixa etária e a vacina utilizada							Vacinar pessoas em situações especiais de risco		NÃO	SIM	NÃO						
Influenza (gripe)							VACINAÇÃO ANUAL																	SIM, Trivalente menores de 6 anos e maiores de 60 anos	SIM, Tri ou Tetravalente e HD3V (60 anos ou +)	SIM, Trivalente			
Febre amarela										Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. / Recomendação do PNI: se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos, indicada uma segunda dose, independentemente da idade atual. Se aplicada a partir dos 5 anos: dose única. / Recomendação da SBIm: Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal mesmo para quem receber a primeira dose a partir dos 5 anos, a SBIm recomenda uma segunda dose dez anos após. / Essa vacina pode ser exigida para emissão do CIVP, atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Neste caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.																	SIM	SIM	NÃO
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)											Duas doses a partir dos 12 meses			Vacinar os não vacinados anteriormente							Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, até 59 anos	SIM	NÃO				
Varicela (catapora)											Duas doses a partir dos 12 meses			Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente							Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM	SIM	SIM				
Hepatite A											Duas doses a partir dos 12 meses			Vacinar os não vacinados anteriormente							Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, uma dose para menores de 5 anos	SIM	SIM				
HPV**																		Duas doses com intervalo mínimo de seis meses entre elas.		Vacinar adultos com três doses (0-1 a 2-6 meses)				SIM, HPV4 uma dose para meninas e meninos de 9 a 14 anos.	SIM, HPV9	SIM, HPV4 três doses para homens e mulheres até 45 anos pertencentes a grupos especiais			
Herpes zóster																			Duas doses, dois meses de intervalo. A partir dos 18 anos, vacinar pessoas em situações especiais de risco		Duas doses, dois meses de intervalo. Rotina a partir dos 50 anos		NÃO	SIM	NÃO				
Dengue***															Qdenga® é recomendada entre 4 e 60 anos, independente de contato prévio com o vírus da dengue – duas doses com intervalo de três meses entre elas.							SIM, Qdenga® para 10 a 14 anos	SIM	NÃO					
Covid-19	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19																												
VSR	Nirsevimabe – Dose única para < 8 meses na primeira sazonalidade												Imunizar crianças em situações especiais de risco									Vacina VSR**** – Uma dose		A partir de 70 anos: Rotina		SIM, Nirsevimabe para prematuros e crianças de risco. Vacina Abrysvo® para gestantes	SIM	NÃO	
VACINAS	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 a 19 anos	20 a 49 anos	50 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS NA REDE PÚBLICA	SERVIÇOS PRIVADOS DE VACINAÇÃO	NA RIE*				
	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																		ADOLESCENTE		ADULTO		IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS					

18/06/2026 – Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos *Calendários de vacinação SBI_m 2026/2027* e nos *Calendários de vacinação SBI_m pacientes especiais*.

* Consultar manual do CRIE em <https://sbim.org.br/images/calendarios/manual-dos-centros-de-referencia-para-imunobiologicos-especiais-6a-edicao-2023.pdf> (em atualização). *Esquemas na RIE* em <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2026/nota-tecnica-no-52-2026-cgici-dpni-vsua-ms.pdf> Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os *Calendários de vacinação SBI_m pacientes especiais*.

** Esquemas para menores de 20 anos. PNI: HPV4 uma dose dos 9-14 anos. SBI_m: HPV9 duas doses dos 9-19 anos e três doses de 20 anos em diante. O PNI oferece a a vacina HPV4, além da rotina, para determinadas situações de risco: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hpv/publicacoes/esquema-vacinal-hpv>

*** *Notas técnicas do MS:* <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue/notas-tecnicas>

**** Arexvy® (GSK) e Abrysvo® (Pfizer) rotina para idosos > 70 anos. Recomendadas para pessoas, em condições de risco, dos 18 aos 69 anos de idade. Ver *Calendário de vacinação SBI_m pacientes especiais*. Uma dose, aplicar a qualquer momento, independente da sazonalidade. Não há dados disponíveis que comprovem a necessidade de doses adicionais. Somente a vacina Abrysvo® (Pfizer) está licenciada para gestantes. Deve ser aplicada em gestantes de qualquer idade, a partir de 28 semanas de gestação, a cada gestação. Uso entre 24 e 27 semanas de IG a critério médico.

Rotina

Vacinar não vacinados

Situações especiais

Contraindicada

Manual do CRIE (em atualização)

Calendários de vacinação SBI_m