

CALENDÁRIO VACINAL SBIIm 2018/2019

Do nascimento à terceira idade.



VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																				ADOLESCENTE 11 a 19 anos	ADULTO 20 a 59 anos	IDOSO A partir de 60 anos	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS			
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 anos	GRATUITAS				NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIES*	
BCG ID	1 Dose	Vacinar os não vacinados anteriormente														Vacinar pessoas contactantes de hanseníase					SIM	SIM	NÃO				
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento							Vacinar os não vacinados anteriormente													SIM	SIM	SIM				
Rotavírus	Duas ou três doses. Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida							CONTRAINDICADA													SIM, monovalente	SIM, monovalente e pentavalente	NÃO				
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)	Quatro doses DTPa ou DTPw iniciando aos 2 meses de idade											Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa	Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, fazer dT)								SIM, DTPw e dT dTpa para gestantes	SIM, DTPa e dTpa	SIM, DTPa				
Haemophilus influenzae tipo b	Quatro doses iniciando aos 2 meses de idade											Vacinar os não vacinados anteriormente		Vacinar pessoas em situações especiais de risco							SIM, três primeiras doses	SIM	SIM, até 19 anos				
Poliomielite (vírus inativados)	Cinco doses iniciando aos 2 meses de idade											Vacinar pessoas em situações especiais de risco								SIM, três primeiras doses	SIM	SIM					
Pneumocócicas conjugadas	Três ou quatro doses iniciando aos 2 meses de idade – VPC10 ou VPC13											VPC10 ou VPC13 - Vacinar os não vacinados anteriormente		VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco				VPC13: uma dose		SIM, VPC10, menores de 5 anos	SIM	SIM, VPC10					
Meningocócicas conjugadas	Duas ou três doses, iniciando aos 3 meses de idade							REFORÇO	REFORÇO			REFORÇO aos 11 anos. Para os não vacinados anteriormente: duas doses, com intervalo de 5 anos		Vacinar pessoas em situações especiais de risco				SIM, menC para menores de 5 anos e adolescentes de 11 a 14 anos	SIM	SIM, menC							
Meningocócica B	Três doses iniciando aos 3 meses de idade							REFORÇO	Para os não vacinados anteriormente: duas doses										Vacinar pessoas em situações especiais de risco		NÃO	SIM	NÃO				
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)	CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO																				SIM	NÃO	NÃO				
Influenza (gripe)	VACINAÇÃO ANUAL																				SIM, menores de 5 anos e maiores de 60 anos	SIM	SIM				
Febre amarela	EM REGIÕES COM RECOMENDAÇÃO DE VACINAÇÃO (DE ACORDO COM CLASSIFICAÇÃO DO MS) – Dose única a partir dos 9 meses de idade. A recomendação de uma segunda dose, especialmente para os vacinados antes de 2 anos de idade, não é consensual, mas deve ser considerada pela possibilidade de falha vacinal.																				SIM	SIM	NÃO				
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os não vacinados anteriormente							Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, até 49 anos	SIM	NÃO				
Varicela (catapora)	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente								SIM	SIM	SIM					
Hepatite A	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os não vacinados anteriormente							Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, uma dose para menores de 5 anos	SIM	SIM				
HPV												Duas doses para meninas e meninos		Vacinar os não vacinados anteriormente. Para menores de 15 anos: duas doses. De 15 anos em diante: três doses.		Vacinar os não vacinados anteriormente, a critério médico (três doses)			SIM, duas doses. Meninas (9 a 14 anos) e meninos (11 a 14 anos)		SIM	SIM					
Pneumocócica 23 valente												Vacinar pessoas em situações especiais de risco								Duas doses com intervalo de cinco anos		NÃO	SIM	SIM			
Herpes zóster																			De 50 a 59 anos: a critério médico		Uma dose		NÃO	SIM	NÃO		
Dengue	CONTRAINDICADA											Recomendada para pessoas soropositivas para dengue, de 9 a 45 anos: três doses: 0 – 6 – 12 meses				CONTRAINDICADA		NÃO	SIM	NÃO							

19/09/2018 • * Consultar manual do CRIE em www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/-01VACINA/manual_procedimentos_2014.pdf

Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os *Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais*.

Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos *Calendários de vacinação SBIIm 2018/2019* e nos *Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais*.

