

EXEMPLO

Triagem: o que avaliar?

Questões que contraindicariam a vacinação:

- () É alérgico a algum componente da vacina COVID-19 que será administrada?
- () Teve reação alérgica grave após administração da primeira dose da vacina COVID-19? (quando a pessoa for fazer a segunda dose)
- () Teve COVID-19 confirmado nas últimas 4 semanas?
- () Teve resultado PCR positivo para COVID-19 na última 4 semanas?
- () Está com febre ou teve febre nas últimas 24 horas?
- () Está com suspeita de COVID-19? Se sim, apresenta sintomas moderados a grave?
- () Tem no momento da vacinação doença aguda moderada a grave?
- () Recebeu a primeira dose da vacina COVID-19 do mesmo laboratório da vacina disponível no dia da vacinação da segunda dose?
- () Recebeu alguma outra vacina nos últimos 14 dias?

Outros questionamentos que são precauções para a vacinação:

- () Recebeu terapia com anticorpos passivos (anticorpos monoclonais ou soro de convalescença) como tratamento para COVID-19?
- () Tem algum comprometimento do sistema imunológico causado por algo como infecção por HIV ou câncer?
- () Toma medicamentos ou terapias imunossupressoras?
- () Distúrbio de sangramento ou está tomando um anticoagulante do sangue?
- () Está gestante?
- () Está amamentando?

Contraindicações gerais

- () Indivíduos com histórico conhecido de reação alérgica grave (por exemplo, anafilaxia) a qualquer componente da vacina.
- () Menores de 18 anos.