

Cliente: SBIm
Assunto: Vacinação
Veículo: R7 (SP)

Data: 15/12/2018
Site: noticias.r7.com

Dia: Sab
RM



NOTÍCIAS

ESPORTES

DIVERSÃO

MEU ESTILO

BLOGS

RECORD TV

VÍDEOS

SERVIÇOS



Adultos que perderam carteira de vacinação devem repetir vacinas

Entre elas estão a tríplice viral, que inclui proteção contra sarampo, hepatites A e B, varicela e tríplice bacteriana; nem todas são oferecidas na rede pública

SAÚDE

Giovanna Boriolo, do R7*

© 15/12/2018 - 05h00

7.7k
COMPARTILHAMENTOS



Adultos que perderam a carteirinha devem ser revacinados

Pixabay

Adultos que perderam a carteira de vacinação infantil devem receber as imunizações previstas para aquela faixa etária — 0 aos 10 anos — que estejam dentro do calendário do adulto, de acordo com a pediatra [Isabella Ballalai](#), presidente da [Sociedade Brasileira de Imunizações \(SBIm\)](#).

Ela afirma que as vacinas obrigatórias para esse período são a tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), hepatites A e B, varicela (catapora) e tríplice bacteriana (difteria, tétano e coqueluche).

Pessoas entre 20 e 59 anos devem receber ainda as doses de imunizações que não existiam durante sua infância. "São quase todas do calendário dos adultos", explica.

Segundo o pediatra Renato Kfourí, vice-presidente da SBIm, o programa de imunizações começou apenas nos anos 1960 e, no caso da vacina contra o sarampo, por exemplo, pessoas acima de 50 anos não a receberam.

Kfourí afirma que só é considerada imune a pessoa que tomou duas doses da imunização depois do primeiro ano de idade, com o intervalo mínimo de um mês entre elas. Portanto, quem tomou apenas uma dose aos 9 meses não está imune. Ele explica que o Ministério da Saúde aplica duas doses da vacina contra sarampo entre um e 29 anos, e dose única entre 30 e 49 anos.

mais lidas

NOTÍCIAS

- 1 Bebê faz sucesso ao nascer com mecha branca no cabelo
- 2 Benefício especial será suspenso para quem não se recadastrar
- 3 Haddad é condenado por ofensas a Edir Macedo
- 4 Cadela é espancada até a morte na frente da família no RJ
- 5 Depoimento de João de Deus tem curto-circuito
- 6 Vídeo mostra PMs agredindo meninas na zona leste de SP
- 7 Mulher conversou com atirador antes da chacina de Campinas

Cliente: SBIm
Assunto: Vacinação
Veículo: R7 (SP)

Seção: Saúde

Data: 15/12/2018
Site: noticias.r7.com

Dia: Sab
RM

"Muitos adultos perdem a carteirinha de vacinação, não lembram se tomaram determinada vacina ou juram que tomaram, mas a condição é contrária. Esses adultos devem ser revacinados e não existe o menor problema de isso acontecer", completa Ballalai.

[Leia também: Teste de vacina contra zika atinge 87% dos voluntários necessários](#)

Porém, Ballalai afirma que, por uma questão cultural, essa faixa etária acredita que não precisa se vacinar. "As pessoas entendem que vacina é 'coisa de criança'. A vacina é para qualquer idade", assegura. A médica ainda diz que há também há falta de costume por parte dos médicos de fazer essas recomendações, afetando a conscientização da necessidade de receber tais imunizações.

veja também

- Vacinas que mulheres adultas devem tomar para prevenir doenças
- Difteria poderá ser novo sarampo se Brasil não atuar na fronteira
- HPV: por que vacinação de adolescentes contra vírus de transmissão sexual que causa câncer não avança no Brasil

Segundo o calendário de imunizações da SBIm, adultos entre 20 e 59 anos devem receber as vacinas tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), hepatite A e B, HPV, tríplice bacteriana (difteria, tétano e coqueluche) ou a dupla adulto (difteria e tétano), varicela (catapora), gripe — a vacina deve ser aplicada anualmente pois, além do tempo de proteção expirar, o vírus em circulação muda —, meningocócicas conjugadas, meningocócica B, febre amarela, pneumocócicas e herpes zóster (a

partir dos 50 anos).

[Leia também: Saiba quem não pode tomar a vacina contra a febre amarela](#)

Entretanto, nem todas essas imunizações estão disponibilizadas na rede pública. O Ministério da Saúde oferece as vacinas tríplice viral, hepatite B, dupla adulto (difteria e tétano), febre amarela, HPV — apenas para adolescentes— e gripe — apenas para grupos de risco em Unidades Básicas de Saúde (UBS). Já clínicas privadas de imunização dispõem de todas as vacinas preconizadas pela SBIm.

Ela afirma que, com orientação médica, as vacinas podem ser tomadas todas no mesmo dia. Para mulheres que pretendem engravidar, as vacinas devem ser tomadas com pelo menos 30 dias de antecedência, também com orientação médica.

[Leia também: Dengue: acordo entre farmacêutica e Butantan pode acelerar vacina](#)

A vacina de HPV deve ser tomada por adultos, com variação de idade entre os sexos. Para mulheres, é recomendada a vacinação entre 9 e 45 anos. Para homens, entre 9 e 26 anos.

Cliente: SBIm
Assunto: Vacinação
Veículo: R7 (SP)

Seção: Saúde

Data: 15/12/2018
Site: noticias.r7.com

Dia: Sab
RM

Segundo Ballalai, o correto é passar antes por uma avaliação médica, para que a pessoa receba orientação sobre a necessidade de tomá-las ou não conforme as restrições individuais.

**Estagiária do R7 sob supervisão de Deborah Giannini*

<https://noticias.r7.com/saude/adultos-que-perderam-carteira-de-vacinacao-devem-repetir-vacinas-15122018>